Groupe Ipesup

Optimal Sup-Spé

CCINP

Maths Spé – CPGE Concours 2026

Mathématiques 1 MP-MPI

Énoncé du sujet

Les calculatrices sont interdites.

Le sujet est composé de deux exercices et d'un problème.

EXERCICE I

On considère deux tables : `ELEVES` et `PAIEMENTS`. La première contient des informations sur des élèves dans une grande école d'ingénieur et la deuxième permet d'identifier quels sont les paiements effectués par les élèves pour la scolarité dans cette école.

La table `ELEVES` contient les attributs suivants :

- `id` : identifiant d'un individu (entier), clé primaire ;
- `nom` (chaîne de caractères) ;
- `prenom` (chaîne de caractères) ;
- `email` (chaîne de caractères) ;
- `promo` : année d'admission dans l'école (int).

La table `PAIEMENTS` contient les attributs suivants :

- `id` : identifiant de suivi (entier), clé primaire ;
- `id_eleve` : identifiant du client représenté par l'attribut `id` dans la table `ELEVES` (entier) ;
- `montant` : montant payé en euros (entier) ;
- `date_paiement` : date du paiement (chaîne de caractères).

Q1. Écrire une requête SQL affichant les emails différents (sans doublons) de tous les élèves qui ne sont pas de la promotion 2025.

Q2. Écrire une requête SQL affichant le nom, le prénom et le montant total payé pour chaque élève. Cette requête devra être triée par nom, puis prénom.

Q3. On souhaite trouver les doublons dans la table `ELEVES`. Écrire une requête SQL affichant les `id` et emails des élèves qui ont au moins deux lignes identiques dans la table `ELEVES` (à l'exception de l'attribut `id`).

Q4. Écrire une requête SQL affichant l'id des élèves n'ayant effectué aucun paiement.

EXERCICE II

Soit X une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{N}$.

On note G_X la fonction génératrice de X définie par :

$$G_X(t) = \sum_{n=0}^{+\infty} P(X = n)\, t^n.$$

Q5. Montrer que G_X est bien définie sur $[-1, 1]$.

Q6. Si X est une variable aléatoire suivant une loi de Poisson de paramètre $\lambda > 0$, rappeler et démontrer l'expression de G_X.

Q7. En utilisant un produit de Cauchy de deux séries entières, démontrer que si X et Y sont deux variables aléatoires indépendantes à valeurs dans $\mathbb{N}$, alors on a :

$$\forall t \in]-1, 1[, \quad G_{X+Y}(t) = G_X(t)\, G_Y(t).$$

Q8. On suppose désormais que X et Y sont indépendantes et suivent des lois de Poisson de paramètres respectifs λ et μ. Déterminer la loi de $Z = X + Y$.

PROBLÈME

Les **parties I** et **II** de ce problème sont indépendantes mais les résultats seront utilisés pour la résolution de la **partie III**.

Partie I – Calcul d'une intégrale

Dans toute cette partie, on pose

$$g(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x}{x^2+t^2}\, e^{it}\, \mathrm{d}t \qquad \text{pour tout } x > 0.$$

Q9. Démontrer que g est bien définie sur $]0, +\infty[$.

Q10. Pour tout $x > 0$, démontrer que

$$g(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{ixu}}{1+u^2}\, \mathrm{d}u.$$

En déduire que g est bornée sur $]0, +\infty[$.

Q11. Démontrer que $\lim\limits_{x\to 0^+} g(x) = \pi$.

Q12. Démontrer que g est de classe $\mathcal{C}^2$ sur $]0, +\infty[$.

Q13. Calculer

$$\frac{\partial^2}{\partial x^2}\left(\frac{x}{x^2+t^2}\right) + \frac{\partial^2}{\partial t^2}\left(\frac{x}{x^2+t^2}\right) \qquad \text{pour } (x,t) \in]0,+\infty[\times \mathbb{R}.$$

En déduire que g est solution de l'équation différentielle $y'' - y = 0$ sur $]0, +\infty[$.

Q14. Pour tout $x > 0$, déterminer une expression de $g(x)$.

Partie II – Formule sommatoire de Poisson

Dans toute la suite, on pose :

$$\forall t \in \mathbb{R}, \quad f(t) = \frac{1}{1+t^2},$$

et

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad F(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} f(x+n) + \sum_{n=1}^{+\infty} f(x-n).$$

Q15. Démontrer que F est bien définie sur $\mathbb{R}$ et 1-périodique.

Q16. Démontrer que F est continue sur $[0,1]$ et en déduire que F est continue sur $\mathbb{R}$.

Pour toute fonction u continue sur $\mathbb{R}$ et 1-périodique, on pose, pour tout $k \in \mathbb{Z}$:

$$c_k(u) = \int_0^1 u(t)\, e^{-2i\pi kt}\, \mathrm{d}t.$$

Q17. Démontrer que

$$c_k(F) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\, e^{-2i\pi kt}\, \mathrm{d}t \qquad \text{pour tout } k \in \mathbb{Z}.$$

Q18. Pour tout $k, n \in \mathbb{Z}$, calculer la valeur de l'intégrale

$$\int_0^1 e^{-2i\pi(n+k)t}\, \mathrm{d}t.$$

Partie III – Applications

On rappelle les notations :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad F(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} f(x+n) + \sum_{n=1}^{+\infty} f(x-n) \qquad \text{et} \qquad f : t \mapsto \frac{1}{1+t^2}.$$

Q19. Calculer $c_0(F)$.

En utilisant les résultats des **parties I** et **II**, calculer $c_k(F)$ pour tout entier $k > 0$.

On admettra que $c_{-k}(F) = c_k(F)$ pour tout $k \in \mathbb{Z}$.

Q20. On pose :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad G(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} c_n(F)\, e^{2i\pi nx} + \sum_{n=1}^{+\infty} c_{-n}(F)\, e^{-2i\pi nx}.$$

Démontrer que G est continue sur $\mathbb{R}$ et 1-périodique.

On admet le résultat suivant :

> *« Si u et v sont deux fonctions continues sur $\mathbb{R}$, 1-périodiques et vérifient $c_k(u) = c_k(v)$ pour tout $k \in \mathbb{Z}$, alors $u = v$ ».*

Q21. Démontrer que $F = G$.

Q22. En déduire la valeur de $F(x)$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.

FIN